



مرکز آموزشی درمانی شهداء تبریز

راهنمای مصرف آکسابین برای بیماران (ریواروکسابن)



کمیته آموزش به بیمار و خانواده

تهیه: لیلا نبی اللهی کارشناس ارشد پرستاری

زیر نظر: آقای دکتر امیری فر (متخصص داخلی)

پاییز 1403

- موضع و فشار دادن محل خونریزی می توان آن را کنترل کرد. نیازی به قطع مصرف دارو نیست و می توان مصرف نوبت بعدی قرص آکسابین را تا چند ساعت به تعویق انداخت. در دوره عادت ماهانه بانوان نیاز به قطع قرص به علت شدید بودن خونریزی نیست و با استراحت کردن و مصرف بیشتر مایعات باید این دوره را گذراند.
- در خونریزی های متوسط تا شدید مثل خون در ادرار یا مدفوع، استفراغ حاوی لخته خون و یا سرفه خونی باید مصرف دارو را متوقف کرده و به پزشک معالج یا اورژانس مراجعه کنید. در این موارد نیاز به بررسی های تخصصی در مورد علت خونریزی، تزریق سرم و در صورت نیاز فراورده های خونی و فاکتورهای انعقاد خون می باشد.

با آرزوی سلامتی شما و خانواده

منابع: کتاب فارماکولوژی داروهای ژنریک ایران

آدرس: تبریز-گلشهر- بلوار گلستان- بیمارستان شهدا

Tell:04133893314-17

نحوه مصرف صحیح آکسابین


- سعی کنید دارو را بصورت منظم و در زمان مشخصی از روز مصرف نمایید. این کار از فراموش کردن مصرف دارو جلوگیری می کند.
- میتوانید قرص را همراه یا بعد از غذا مصرف کنید، زیرا مصرف این دارو همراه غذا، جذب آن را از طریق معده افزایش میدهد.
- در صورت فراموشی یک نوبت مصرف آکسابین، به محض یادآوری دارو را مصرف نمایید. از دو برابر نمودن مقدار مصرف در یک نوبت خودداری کنید.

مدیریت خون ریزی در حین مصرف دارو

- در صورت خونریزی های موضعی مثل خونریزی از بینی و لثه یا بریدگی سطحی و کوچک با گذاشتن کمپرس سرد در

آکسابین چیست و چگونه عمل می کند.

آکسابین یک داروی جدید از دسته داروهای ضد انعقاد خوراکی می باشد. این دارو با کنترل و مهار برخی فاکتورهای انعقادی در خون میزان انعقاد پذیری خون را کاهش می دهد و قادر به حل کردن و از بین بردن تدریجی لخته های تشکیل شده در عروق می باشد. کنترل تشکیل لخته و یا از بین بردن لخته ها از بروز آمبولی ریه و سکته مغزی که ناشی از حرکت لخته های کنده شده از عروق عمقی به سمت ریه و از قلب به سمت مغز و سایر اندامها پیشگیری می کند. همچنین آکسابین در مواردی مثل برخی اعمال جراحی به صورت پیشگیرانه برای اجتناب از بروز لخته در وریدهای عمقی تجویز می شود.



1

قرص آکسابین در چه مواردی تجویز می شود؟

- پیشگیری از بروز ترمبوز وریدهای عمقی و آمبولی ریه بعد از انجام عمل های جراحی تعویض مفصل زانو و تعویض مفصل ران
- درمان ترمبوز وریدهای عمقی پا
- درمان آمبولی ریه
- پیشگیری از عود مجدد ترمبوز وریدهای عمقی و آمبولی ریه درمان شده
- پیشگیری از ایجاد لخته و کاهش ریسک سکته مغزی در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی، در بیمارانی که تنگی متوسط تا شدید دریچه میترال و یا دریچه مصنوعی فلزی نداشته باشند

عوارض ناخواسته قرص آکسابین.

- در صورت مشاهده هر گونه علائم خونریزی (استفراغ خونی، وجود خون در ادرار، مدفوع یا خلط، خونریزی لثه، خونریزی غیرطبیعی واژینال، کبودی و کوفتگی بی دلیل در پوست و ...) حتما به پزشک مراجعه کنید.

2

- در صورت مشاهده تغییرات غیرطبیعی مثل افزایش درجه حرارت بدن، ورم در ناحیه پا یا مچ، بروز لکه های قرمزپوستی و خارش، با پزشک خود مشورت کنید.

نکات مهم قبل از مصرف قرص آکسابین

- لیست کاملی از داروهای مصرفی خود را در اختیار پزشک قرار دهید تا در صورت احتمال بروز تداخل دارویی، اقدام لازم صورت گیرد.
- چنانچه سابقه زخم گوارش و فشارخون بالا دارید، به پزشک اطلاع دهید.
- در صورت بارداری یا شیردهی، پزشک خود را در جریان قرار دهید.
- چنانچه به این دارو یا داروهای مشابه، حساسیت دارید حتما پزشک را در جریان قرار دهید.
- در صورت اختلال کبدی یا کلیوی، پزشک خود را در جریان قرار دهید.

3