



دفاتر بهداشتی در تبریز

مرکز آموزشی درمانی شهدا تبریز



کمیته آموزش به بیمار و همگانی

زیر نظر : دکتر قهرمانی(متخصص عفونی)

تهیه: ثریا قلی پور (کارشناس ارشد پرستاری)

بازبینی: تابستان 1403



آدرس: تبریز - گلشهر - بلوار گلستان - بیمارستان شهدا

Tell: 041-33893314-17

با مراجعه به لینک ارتقای سلامت در وب سایت مرکز به Shohada Medical Research & Training آدرس Hospital می توانید پمفت و مطالب آموزشی را دریافت و مطالعه نمایید.

روش صحیح شستن دست:

روش درست شستن دست‌ها

در ۱۰ مرحله

۱. دست‌ها را خوش آزاد کنید
آن ها را استوکن کنید
۲. دست‌ها را با یکدیگر می‌شستند
آن ها را از یکدیگر جدا کنید
۳. دست‌ها را از یکدیگر جدا کنید
پستانک را بشستند
۴. دست‌ها را با یکدیگر می‌شستند
آن ها را از یکدیگر جدا کنید
۵. دست‌ها را با یکدیگر می‌شستند
آن ها را از یکدیگر جدا کنید
۶. دست‌ها را با یکدیگر می‌شستند
آن ها را از یکدیگر جدا کنید
۷. دست‌ها را با یکدیگر می‌شستند
آن ها را از یکدیگر جدا کنید
۸. دست‌ها را با یکدیگر می‌شستند
آن ها را از یکدیگر جدا کنید
۹. دست‌ها را با یکدیگر می‌شستند
آن ها را از یکدیگر جدا کنید
۱۰. دست‌ها را با یکدیگر می‌شستند
آن ها را از یکدیگر جدا کنید

آرزوی ما، سلامتی و تقدیرتی خانواده‌هاست

۴

روش تهیه محاول ضد عفونی از واکسین:

ابتدا یک بطری یا ظرف مناسب جهت تهیه محلول فراهم کنید، سپس یک پیمانه واکسین درون ظرف بریزید و بعد پنج پیمانه آب سرد اضافه کنید. دستمال به محلول آغشته کنید و روی سطوح مورد نظر بگشید رطوبت سطح باید خودبخود خشک شود حدود 10 دقیقه زمان لازم است تا محلول ضد عفونی اثر کند.

توجه: برای تهیه محلول از آب سرد استفاده شود.



- به کسی اجازه عیادت ندهید تا زمانیکه کاملاً بهبود باید و هیچ علامتی نداشته باشید(این روند حدود 14 روز طول می کشد).
- فردی که از بیمار مراقبت می کند قبل از ورود به اتاق بیمار باید یک ماسک ساده پوشید.
- توجه کنید قبل از پوشیدن ماسک دست ها را خوب بشوئید.
- دقت داشته باشید تحت هیچ شرایطی ماسک و دستکش استفاده شده را مجدداً مصرف نکنید.
- محل هایی از اتاق که شما مکرر با آنها در تماس هستند باید به طور مکرر ضد عفونی شود.(به صورت مداوم دستگیره درب ها، اتاق ها و سرویس های بهداشتی را ضد عفونی نمائید).



مددجوی محترم حال که سلامتی خود را نسبتاً بازیافتد لطفاً نکات زیر را در منزل به دقت مطالعه و رعایت نمائید.

- داروهای تجویزی خود را به طور منظم در زمان های ذکر شده در نسخه، مصرف کنید و حتی اگر احساس بهبودی می کنید داروها را قطع نکنید، تا دوره درمان کامل شود.
- در صورتیکه سرفه شما بدتر شد، مجدد تب کردید یا تنگی نفس شما تشید شد بلافتاصله به مرکز درمانی مراجعه نمائید.
- شما باید در یک اتاق مجزا از سایر اعضای خانواده استراحت کنید.
- ظرف غذا و قاشق و چنگال شما باید از بقیه مجزا باشد. این وسایل باید پس از مصرف با آب و مایع ظرف شویی و جدا از ظروف سایر اعضای خانواده شسته شود